Búsqueda de genes marcadores asociados a la tolerancia en la soja y de factores de patogenicidad del hongo *Macrophomina phaseolina*

Proyecto asociativo:

CAPECO

FCQ-UNA

FCyT-UCA

Royal Holloway, University of London

Macrophomina phaseolina

- Afecta a más de 500 especies
- La infección es favorecida por las altas temperaturas (30°C) y bajo potencial hídrico
- No existe un método efectivo para su control
- La resistencia del hospedero el único método factible para el control de esta enfermedad

El estudio de la interacción planta-patógeno y la biología del patógeno son importantes

Macrophomina phaseolina

- El genoma de *M. phaseolina* (cepa MS6 aislada de jute en Bangladesh) ha sido secuenciado en el año 2012
- Posee un gran repertorio de enzimas para degradar los componentes principales de la pared celular y la cutícula
- Posse alto número de enzimas carbohidrato-activos e involucrados en la degradación de la lignina
- No existen pruebas experimentales de cuales de estos genes realmente están asociados a la patogénesis

Respuesta de la planta frente a *M. phaseolina*

- Cambio en la expresión de genes involucrados en la vía de etileno, ácido jasmónico y auxina
- El tratamiento de *M. truncatula* con metil-jasmonato, etileno y auxina han aumentado parcialmente la resistencia frente a *M. phaseolina*
- Se basaron en el análisis de una sola variedad cuya tolerancia a *M. phaseolina* es desconocida o no está caracterizada
- **A pesar de la importancia económica de la soja y la pérdida significativa que causa *M. phaseolina*, este tipo de estudio no se han realizados en la soja**

Objetivos

- En base a estudios de expresión génica en respuesta a varios patógenos y bacterias simbióticas: **seleccionar genes candidatos de soja** que estén asociados a la tolerancia a *Macrophomina*
- Buscar probables **factores de patogenicidad de *Macrophomina*** realizando búsquedas en el genoma mediante herramientas bioinformáticas aplicadas en biología de sistemas

Plan de trabajo

Resultados esperados

- 1) Diferencia en la tolerancia entre las variedades de soja
- 2) Genes marcadores asociados a la resistencia de soja contra *Macrophomina*
- 3) Genes marcadores asociados a la patogenicidad de *Macrophomina*
- 4) Formación de capital humano
- 5) Difusión de los resultados en el ámbito académico y científico

Cronograma de actividades

Periodo: octubre del 2017 al marzo del 2018

- Infección *in vitro* de la soja con *Macrophomina*
- Búsqueda de genes probables asociados a la tolerancia de la soja

Periodo: abril al setiembre del 2018

- Aislamiento de ARN de la soja infectada con *M. phaseolina* y diseño de primers

Periodo: octubre del 2018 al marzo del 2019

- Verificación de los genes de candidatos asociados a la tolerancia en soja mediante PCR en tiempo real
- Búsqueda de genes probables asociados a la patogenicidad y diseño de primers

Periodo: abril al setiembre del 2019

- Verificación de genes asociados a la patogenicidad del hongo mediante PCR en tiempo real

A lo largo del proyecto

- Formación de capital humano: formación de estudiantes de grado y post-grado, realización de charlas
- Difusión de resultados en congresos, seminarios, publicación de artículos científicos